



新时代·新征程·新作为

中华护理学会全国呼吸护理新进展学术交流会

集束化护理对减少ICU大便失禁性皮炎发生的临床研究

作者：黄茜

所在工作单位/机构：陆军军医大学第二附属医院新桥医院呼吸科监护室

目的：



探讨集束化护理减少ICU重症患者大便失禁性皮炎的发生率。选取我科ICU2016年1月至2017年12月收治的大便失禁性患者131例，其中对照组65例及实验组66例；

对照组采用常规护理干预措施，实验组则采用集束化护理干预进行预防，观察两组大便失禁性皮炎发生率。对照组的大便失禁性皮炎发生率75.7%，实验组的大便失禁性皮炎发生率34.38%，实验组预防效果显著优于对照组($P < 0.05$)。集束化护理减少ICU大便失禁性皮炎的发生，具有良好的预防效果，值得临床推广应用。

方法：

采用前后对照方法，对照组：统计2016年1月-12月ICUIAD发生率。对2017年1月-12月收治的大便失禁患者开展集束化护理措施。集束化护理措施主要有以下几方面。

- 1.充分评估患者大便失禁及皮肤情况；
- 2.选择合适的皮肤清洁剂。
- 3.根据大便失禁的情况采取适宜的护理措施；
- 4.加强巡视，建立每班评估机制；
- 5.开展全体医护人员培训教育，规范各项操作。统计开展集束化护理后IAD发生率。

结果：



新时代·新征程·新作为

中华护理学会全国呼吸护理新进展学术交流会



两组患者护理效果比较

实验组在发生率上明显高于对照组，差异有统计学意义 ($P < 0.05$)，详见表1。

表1 两组患者护理效果比较[n (%)]

组别	0发生期		I期		II期	
	有效	有效	有效	有效	有效	有效
实验组 (n=66)	45 (68.18)	19 (28.79)	2 (3.03)	0 (0)	64 (100)	
对照组 (n=65)	22 (33.84)	36 (55.38)	6 (9.23)	1 (1.54)	58 (90.6)	



新时代·新征程·新作为

中华护理学会全国呼吸护理新进展学术交流会

注：与对照组相比，*： $\chi^2=6.771$ ， $P=0.009$ ； $\chi^2=1.463$ ， $P=0.226$ 。

结论：

本研究结果显示，对照组的发生率75.7%，实验组的发生率34.38%，实验组预防效果显著优于对照组($P < 0.05$)，其差异有统计学意义。集束化护理减少ICU大便失禁性皮炎的发生，具有良好的效果，值得临床推广应用。由此可见，责任护士尽早对患者进行护理干预，充分评估患者皮肤问题及全身营养状况，采取合理的个体化护理措施，能有效减少IAD的发生，减轻患者痛苦，提高护理质量。